

x L'ALBO

COMUNE DI AMALFI

27 GEN. 2012

Prot. N.

865



Assessorato Agricoltura

A.G.C. SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO - SeSIRCA

STAPA-CePICA di

BOLLETTINO FITOSANITARIO ZONALE

Edizione del Ce.S.A di Salerno - Agro "Costa d'Amalfi"

(Comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca Dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano, Ravello, Positano, Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare)

*Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa delle piante
n. 2 del 25 gennaio 2012*

Andamento meteorologico dal 11/01/12 al 24/01/12

Stato dell'atmosfera variabile, temperature ed umidità in aumento, venti deboli, piogge di lievi entità sabato 14 e venerdì 20 gennaio. *Gli altri dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito: www.sito.regione.campania.it/agricoltura.*

Giorno	T Media	T min	T max	Precip.	Umidità	Vento Max	Raffica	Fenomeni
11	11 °C	9 °C	13 °C	-	65%	11 km/h	-	Nessuno
12	12 °C	10 °C	15 °C	-	81%	11 km/h	-	Nessuno
13	13 °C	11 °C	16 °C	-	86%	11 km/h	-	Nessuno
14	11 °C	10 °C	13 °C	n/d	62%	11 km/h	-	pioggia
15	9 °C	7 °C	10 °C	-	42%	9 km/h	-	Nessuno
16	8 °C	6 °C	10 °C	-	46%	13 km/h	-	Nessuno
17	7 °C	5 °C	9 °C	-	53%	13 km/h	-	Nessuno
18	9 °C	6 °C	10 °C	-	65%	9 km/h	-	Nessuno
19	11 °C	8 °C	16 °C	-	77%	9 km/h	-	Nessuno
20	12 °C	12 °C	13 °C	n/d	87%	28 km/h	-	pioggia
21	12 °C	10 °C	14 °C	-	81%	9 km/h	-	Nessuno
22	13 °C	11 °C	16 °C	-	81%	6 km/h	-	Nessuno
23	13 °C	12 °C	16 °C	-	81%	-	-	Nessuno
24	13 °C	10 °C	17 °C	-	83%	9 km/h	-	Nessuno

Stato fitosanitario delle colture

COLTURA

LIMONE

UTM				Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
N°	Comune	Località	Azienda			
1	TRAMONTI	Paterno	Russo	Sfusato	Ingross. frutti	Cocciniglia bianca al di

			Anna M.	Amalfitano	- invaiatura frutti	sotto della soglia d'intervento, presenza di Mal secco
2	MAIORI	S. Maria D. Grazie	Buonocore Antonio	Sfusato Amalfitano	Come sopra	Come sopra.

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA:

Gommosi del colletto, Marciume radicale, allupatura (*Phytophthora spp.*):

- adottare portainnesti resistenti (es. arancio amaro);
- evitare l'eliminazione delle parti infette nella zona del colletto, in quanto attraverso le ferite prodotte si espone la pianta ad attacchi di Mal secco fulminante;
- evitare ristagni idrici in prossimità del colletto;
- alla comparsa dei primi sintomi intervenire con **prodotti rameici** con trattamenti alla base del tronco delle piante vicine a quelle infette.

Mal secco

- Estirpare le ceppaie di piante infette;
- Tagliare (30 cm al di sotto del punto d'infezione) e bruciare i rami infetti, disinfettare gli attrezzi e proteggere le superfici di taglio con mastici;
- Evitare lavorazioni al terreno da metà autunno a primavera avanzata;
- Non eccedere nelle concimazioni azotate; Nel periodo compreso **tra ottobre ed aprile** e solo in seguito ad eventi meteorici avversi (grandinate, gelate, forti venti, ecc.) **intervenire con prodotti a base di composti rameici.**

Fumaggini (*Capnodium spp.*, *Limacinia spp.*, *Pleosphaeria spp.*, etc.): provvedere all'areazione della chioma con la potatura, contenere le concimazioni azotate.

Nome coltura

VITE

UTM				Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
N°	Comune	Località	Azienda			
1	Tramonti	Corsano	Tagliaferro	Ruratiello	Riposo vegetativo	Nulla da segnalare
				Tintore		
				Piedirosso		
2	Tramonti	Capitignano	Apicella Giuseppe	Piedirosso		Nulla da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA: *Nessun intervento*

AVVISI E NOTIZIE UTILI

CINIPIDE DEL CASTAGNO

SI FORNISCONO A TUTTI GLI INTERESSATI LE SEGUENTI INDICAZIONI UTILI PER IL CORRETTO CONTROLLO DEL CINIPIDE DEL CASTAGNO:

- NEL CASTAGNETO PUO' RISULTARE UTILE LASCIARE DELLE AREE DESTINATE ALLA PRESENZA DI ALTRE PIANTE (QUERCIA, OLMO, CARPINO, ONTANO, FAGGIO, ROSA CANINA, ECC.) AVENDO CURA DI NON DISTRUGGERE LE GALLE PRESENTI SU DI ESSE IN QUANTO RIFUGIO DEI NEMICI NATURALI DEL CINIPIDE.

BUONE PRATICHE PER IL CONTROLLO DEL CINIPIDE DEL CASTAGNO: Al fine di tutelare l'ecosistema castagneto e considerando i principi della salvaguardia ambientale si consiglia, per il controllo del cinipide, di attenersi alle seguenti pratiche:

- Entro fine giugno: - provvedere ad asportare e distruggere le galle presenti sulle piante senza tagliare grossi rami e branche;
- Da luglio: -lasciare, fino all'anno successivo, le galle presenti sulle piante perchè all'interno potrebbero esserci degli

insetti nemici del cinipide;

- Non effettuare trattamenti insetticidi nel castagneto perchè possono essere dannosi per le api, avere effetti negativi sull'impollinazione, sulla produzione e colpire gli insetti utili; Eventuali trattamenti dopo il 20 luglio sono assolutamente inefficaci;
- Non utilizzare diserbanti perchè non uccidono il cinipide ma inquinano il suolo, le acque e distruggono i prodotti del sottobosco (funghi, origano, fragole, ecc.);
- Lasciare nel castagneto delle aree destinate alla presenza di altre piante (quercia, olmo, carpino, ontano, faggio, rosa canina, ecc.) avendo cura di non distruggere le galle presenti su di esse in quanto rifugio dei nemici naturali del cinipide;
- Ridurre al minimo la presenza di persone ed animali nei castagneti attaccati nel periodo dello sfarfallamento (15 giugno - 20 luglio) per evitare di diffondere, involontariamente, l'insetto dalle aree infestate a quelle sane;
- inoltre pulirsi accuratamente gli indumenti prima di spostarsi in altri castagneti.

PRLFI 2011 Revoca p.a. Fenazaquin

Si comunica che il principio attivo **Fenazaquin**, presente nelle "Norme tecniche di difesa fitosanitaria ..." del 2011 è stato revocato. La commercializzazione e la vendita è consentita fino al 30 luglio 2012, l'utilizzo fino al **30 novembre 2012**.

Piano Nazionale di Sostegno al settore del vino Misura della Ristrutturazione e Riconversione vigneti - Campagna 2011/2012

Si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 209 del 20/12/2011 il Settore Interventi per la Produzione Agricola ha disposto l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di adesione alla misura della Ristrutturazione e Riconversione vigneti per la campagna di pagamento 2011/2012, apportando alcune modifiche alle disposizioni regionali di attuazione della misura di cui all'allegato A3 del medesimo provvedimento. **Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 22 dicembre 2011 e fino al 29 febbraio 2012**, a pena di esclusione, secondo le modalità previste dal suddetto DDR.

Per informazioni rivolgersi al CeSA di Salerno, Via Abella Salernitana n. 3, tel. e fax 089/759036 e-mail: p.maiellaro@maildip.regione.campania.it - dr Paolo Maiellaro e dr Antonio Vitolo.
Orari di ricevimento: 10.00 - 13.00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.

Il Bollettino fitosanitario è lo strumento ufficiale attraverso cui verranno comunicate alle aziende aderenti al PRLFI, oltre che gli aspetti tecnici, anche tutti gli adempimenti di natura amministrativa inerenti il Piano stesso. Tutte le informazioni relative al PRLFI in vigore (Piano attuativo, Norme tecniche, modalità di adesione, scadenze, modulistica, bollettini fitosanitari) sono disponibili sul sito della Regione Campania all'indirizzo www.sito.regione.campania.it/agricoltura

EVENTUALI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE AL NUMERO VERDE 800.80.10.17.

Il presente Bollettino è stato redatto a cura del tecnico dr A. Vitolo dello STAPA CePICA di SALERNO - CESA di Salerno Via Abella Salernitana, 3 tel. 089-2589610 fax 089.2589648 e-Mail: stapacepica@tiscalinet.it

Il prossimo bollettino sarà disponibile il 8 febbraio 2012